

# 2022 Прививки для детей от рождения до 7 лет

В роддоме	1 месяц	2 месяца	3 месяца	4,5 месяца	6 месяцев	9 месяцев	12 месяцев	15 месяцев	18 месяцев	20 месяцев	6-7 лет
БЦЖ	ВГВ				ВГВ						
	ВГВ	ПКВ			ПКВ				ПКВ		
		ИПВ АКДС Hib	ИПВ АКДС Hib	ИПВ АКДС Hib					ИПВ АКДС Hib	БОПВ	БОПВ АДСм или Адасель
Грипп (ежегодно)*											
							КПК				КПК

↑ ↑ ↑ **Обязательные** ↑ ↑ ↑

↓ ↓ ↓ **Рекомендуемые** ↓ ↓ ↓

Здоровым детям нет необходимости сдавать анализы крови или мочи перед прививкой



RotaV RotaV RotaV

ПКВ

MenACWY\*\* MenACWY\*\*

Ветр.Оспа

Ветр.Оспа

MenACWY\*\*

Гепатит А

Гепатит А

## Примечания:

\* Две дозы с перерывом в 4 недели для детей возрастом от 6 месяцев до 8 лет, если они получают вакцину впервые, и для некоторых групп детей того же возраста по рекомендации врача.

\*\* Две дозы для детей с 9 месяцев, либо одна доза для детей от 2 лет и старше. (Ревакцинация через 5-7 лет)

## Обратите внимание:

Если ваш ребёнок пропустил прививку, вам не нужно начинать все с начала - приходите на следующий приём к своему врачу. Если у вас есть вопросы о вакцинации - задайте их своему педиатру.

*Если у ребенка есть какие-либо заболевания, которые создают риск инфекции, или он покидает территорию России - поговорите с педиатром о дополнительных прививках, которые могут понадобиться.*

**Вакцина против клещевого энцефалита (Tick-Borne Encephalitis - TBE) применяется для эндемичных регионов, по согласованию с педиатром. Схема вакцинации: 1ая доза по назначению, 2ая через 1-3 месяца, 3я через 9-12 месяцев.**

Жёлтые прямоугольники указывают на возрастной диапазон, когда должна быть введена прививка.



**Ждёте ребёнка?**  
Чтобы защитить вас и вашего малыша от коклюша - получите вакцину Адасель(Tdap). Её рекомендуется вводить с 27 по 36 неделю беременности. Подробности узнайте у своего врача.

БЦЖ (BCG) - вакцина против туберкулёза.  
ВГВ (Hep B) - вакцина против вирусного гепатита В.  
ИПВ (IPV) - инактивированная полиомиелитная вакцина.  
БОПВ (OPV) - бивалентная оральная полиомиелитная вакцина.  
ПКВ (PCV) - пневмококковая конъюгированная вакцина (Превенар 13 или Синфлорикс)

АКДС (DTaP) - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина.  
АДСм (Td) - вакцина против столбняка и дифтерии.  
КПК (MMR) - вакцина против кори, паротита, краснухи.  
RotaV - вакцина против ротавируса.  
Hib - вакцина против гемофильной инфекции типа В.  
MenACWY - вакцина против менингококковой инфекции.

Подготовлено с использованием календаря CDC:

